

GENERALIDADES

Producto:	AZOXISTROBIN DEL MONTE 50 WG
Tipo de Producto:	Fungicida Agrícola
Formulación:	Gránulos Dispersables - WG
Categoría Toxicológica:	III – Ligeramente Peligroso
Cultivo:	Rosa, Uva.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

AZOXISTROBIN DEL MONTE 50 WG es un fungicida de amplio espectro, con acción preventiva, curativa y erradicante; inhibe la germinación de las esporas y estados tempranos de desarrollo de los hongos, crecimiento del micelio y la esporulación. El ingrediente activo, azoxistrobina, pertenece a una clase de fungicidas llamado estrobilurinas, que actúan por la respiración mitocondrial en los hongos inhibiendo y deteniendo el suministro de energía.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Azoxystrobin500 g/Kg
methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate de
formulación a 20°C

Ingredientes
aditivos.....c.s.p. 1Kg

RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Agrónomo o Ingeniero Agrónomo”

Cultivo	Maleza	Dosis	P.C.	P.R.
Rosa*	Mildeo Velloso (<i>Peronospora sparsa</i>)	600 g/ha (0.5 g/L de agua)	N.A.	4 Horas
Uva (<i>Vitis vinifera</i>)	Oidio de la Vid (<i>Uncinula necator</i>)	1 kg/ha	14 días	24 horas

P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

N.A.: No aplica

(*) Para ornamentales: Debido al alto número de especies ornamentales que dificultan el desarrollo de pruebas de eficacia agronómica para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el objetivo de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

AZOXISTROBIN DEL MONTE 50 WG es un fungicida preventivo curativo, aplicar preventivamente con el inicio de los primeros síntomas cuando las condiciones ambientales favorezcan la enfermedad. Realizar una (1) sola aplicación por ciclo de cultivo. Debe usarse en lo posible alternado con otros fungicidas de diferente modo de acción.

EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Se puede aplicar con los equipos terrestres de uso común. Es importante asegurar buen cubrimiento de todo el follaje. Llenar el recipiente o tanque del equipo de aspersión hasta la mitad de su volumen, agregar la dosis de AZOXISTROBIN DEL MONTE 50 WG agitar vigorosamente, completar el volumen y mantener la agitación.

Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox. Volumen de aplicación 1200 L/ha.

FICHA TÉCNICA
AZOXISTROBIN DEL MONTE 50 WG
Registro Nacional ICA No. 1635
Titular del Registro: DEL MONTE AGROSCIENCES S.A.S.



COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. Se recomienda en caso de duda hacer un ensayo a pequeña escala para observar fitocompatibilidad. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS 24 HORAS
CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

Importado y Distribuido por:
Del Monte Agrosiences S.A.S.